

Influencia De La Terapia De Risa En Los Valores Hematológicos Y Comportamiento Psico-Social En Pacientes Pediatricos Con Leucemia Linfoblastica Aguda.

Díaz S. Jorge E, Durán G. Giselle L, Echenique Z. Patricia Z, Godoy B. Eliana Y.

Sepulveda. Sergio.

Titora: Dra. Silvana D´Anello

RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la terapia de risa en pacientes pediátricos con Leucemia linfoblástica Aguda. Se utilizó un diseño experimental antes-después con un grupo de 5 niños que asistían en condición de pacientes de la unidad de hematología del I.A.H.U.L.A, cuyas edades estaban comprendidas entre los 4 a 6 años. Antes, durante y después de la terapia, se les aplicó un test a los niños, padres y personal de salud que midió la presencia de dolor, el estado de ánimo y la actitud del niño ante los payasos, el tratamiento y hacia el personal de salud. Se realizó un registro de los valores hematológicos de cada niño 12 semanas previas a la intervención y durante la intervención. El grupo de niños recibió terapia de risa un día a la semana, durante 4 horas, por un periodo de 12 semanas. Los resultados mostraron una disminución significativa de la ansiedad del niño, mejora del estado de ánimo, mayor tolerancia al dolor, mejor aceptación del tratamiento, mejor ambiente hospitalario y mejor relación médico – paciente. Los valores hematológicos no reflejaron cambios estadísticamente significativos antes y después de la intervención. Sin embargo, se obtuvieron datos relevantes.

Palabras clave: Risoterapia; Humor; Estrés; Risa, Leucemia linfoblástica aguda, LLA.